

Voorgestelde maximum wachttijden tot start behandeling ivm Covid-19, WOU 26 mrt 2020

Diagnostiek

- zoveel mogelijk binnen de normen proberen af te ronden afhankelijk van lokale capaciteit
- Blaas
 - macrohematurie 1 week UCS
 - TURT 3 weken bij verdenking MIBC; andere max 6 weken (JO)
- Prostaat
 - verhoogd PSA 1 week (belconsult o.a. klachten)
 - bij hoog PSA en/of afwijkend RT poli 2 wkn (RJAM)
 - screening PSA is 3-6 maanden uitstel mogelijk (RJAM)
- NVMO adviseert om neoadjuvante systeemtherapie voor MIBC niet uit te voeren en in plaats van vroege docetaxel te kiezen voor abiraterone + predinison.

			Maximale wachttijd
Prostaat		ISUP 3 ISUP 4/5	6 maanden 3 maanden
Blaas	NMIBC	Diagnostiek macrohematurie (UCS) niet uitstellen Low grade High grade	< 6 maanden < 3 maanden
	MIBC	Diagnostiek macrohematurie (UCS) niet uitstellen Cystectomie M+	< 3 maanden zie adviezen NVMO
Nier	Small Renal Mass RCC	T1a (tenzij active surveillance)	6 maanden
	Overig RCC	T1b-T2 T2b T3/IVC M+	< 6 maanden < 3 maanden < 6 weken zie adviezen NVMO
Testis		Stadium 2 en hoger	Geen uitstel van diagnostiek en behandeling
Penis		PEIN of Ta-T1	3 maanden
		>T1	6 weken
Ureter/pyelum	UTUC	< 2cm Low grade > 2cm High grade cT3Gx	< 3 maanden < 3 maanden < 6 weken